

Instrukcja użytkowania i dozowanie

Zalecane dozowanie: 1 tabletka/ 10 L wody



PRZED



PO

Dopóki tabletka znajduje się w folii wodorozpuszczalnej, specjalne środki ochrony nie są wymagane. Po umieszczeniu tabletki w wodzie należy przestrzegać zwykłych środków ostrożności. Wybór odpowiedniego sprzętu ochronnego musi być przeprowadzony na podstawie analizy ryzyka.



- 1** Srebrna folia ochronna musi zostać usunięta przed użyciem produktu.



- 2** Tabletka pokryta folią rozpuszczalną jest produktem gotowym do użycia!



1. Wyłącz frytkownicę w celu wystudzenia oleju. Zlej olej.



2. Wypełnij zbiornik frytkownicy wodą ponad elementy grzejne. Poziom wody nie powinien przekroczyć znacznika maksymalnego poziomu zbiornika



3. Dodaj tabletkę w folii wodorozpuszczalnej zgodnie z tabelą dozowania.



4. Nagrzej frytkownicę do temperatury 80-100°C, utrzymuj żądaną temperaturę przez 15-20 minut do czasu rozpuszczenia przypalonego tłuszczu**.



5. Wyłącz frytkownicę i poczekaj do ochłodzenia roztworu (ok. 80-40°C)***. Zewnątrz części urządzenia można wyczyścić produktem PURINA gotowym do użycia za pomocą szczotki lub nierysującego pada.



6. Przeplucz frytkownicę kilka razy zimną lub ciepłą wodą, następnie dokładnie wysusz.

**Prosty w użyciu,
silny w czyszczeniu.**

Rozpuszczalna w wodzie folia w znacznym stopniu zapobiega kontaktowi ze skórą*.

*Wybór odpowiedniego sprzętu ochronnego musi być przeprowadzony na podstawie analizy ryzyka związanego z konkretnym rodzajem działalności przedsiębiorstwa.

**W przypadku silnych zanieczyszczeń można wydłużyć czas gotowania lub podwoić dawkę. Podczas czyszczenia sito może być zanurzone bezpośrednio w roztworze roboczym. W przypadku frytkownic bez programu gotowania należy doprowadzić płyn do wrzenia unikając wychłapywania roztworu poprzez zmniejszanie temperatury.

*** Opróżnij frytkownicę z roztworu roboczego do odpowiedniego pojemnika (odpornego na ciepło i alkalia)-NIE do wózka na zużyty olej.